

Natural History Museum Library

•			
	9		
	•		

		1.	
			į į
	Ÿ		
4			

ABHANDLUNGEN

DER

GROSSHERZOGLICH HESSISCHEN

GEOLOGISCHEN LANDESANSTALT

ZU DARMSTADT.

ATLAS

zu Band I. Heft 2.

Elf lithographische Tafeln mit Erläuterungen.



DARMSTADT.

IN COMMISSION BEI A. BERGSTRÄSSER.
1885.

	•			
				-
	•			
		. 141		
,				
		4.0		

DIE FAUNA

DER

KALKE VON WALDGIRMES

BEI GIESSEN.

VON

✓FRIEDRICH MAURER.

ATLAS

VON ELF LITHOGRAPHISCHEN TAFELN MIT ERLÄUTERUNGEN.



DARMSTADT.

IN COMMISSION BEI A. BERGSTRÄSSER.


1885.


(1.9° C°)



Tafel I.

- Fig. 1. Syringopora compressa Maur.
 - 1. Bruchstück in zweifacher Vergrösserung.
 - 1a. Längsschnitt eines bereits angewitterten Exemplares in zweifacher Vergrösserung.
- Fig. 2-4. Syringopora expansa Maur. (vergl. auch Taf. III. F. 1, 2.)
 - 2. Querschnitt, 2a. Längsschnitt, in natürlicher Grösse.
 - 3. Längsschnitt eines anderen Exemplares in natürlicher Grösse.
 - 4. Längsbruch in natürlicher Grösse.
 - 4a. Längsbruch in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 5-7. Aeanthodes retinens Maur.
 - 5. Längsschnitt, 5a. Querschnitt in nat. Grösse.
 - 6. Stock mit fehlender Epidermis.
 - 7. Längsbruch eines Stockes.
- Fig. 8. Acanthodes pastinatus Maur.
 - 8. Längsschnitt, 8a. Querschnitt in nat. Grösse.
- Fig. 9, 10. Amplexus tortuosus Phill.
 - 9. und 10. Zwei Längsschnitte in nat. Grösse.
 - 10a. Obere Bodenfläche in nat. Grösse.
- Fig. 11-18. Amplexus mutabilis Maur.
 - 11. Stock mit theilweise erhaltener Epidermis.
 - 12-15. Verschiedene Längsschnitte.
 - 16. Querschliff. 17. obere, 17a. untere Bodenfläche.
 - 18, 18a. Zwei zusammengewachsene, an die innere Wand des Mutterpolypen sich anlehnende Knospen.
- Fig. 19, 20. Amplexus immissus Maur.
 - 19. Stock mit theilweise erhaltener Epidermis.
 - 19a. Querschliff, 20. Längsschliff.
- Fig. 21. Lophophyllum constrictum Maur.
 - 21. Exemplar in nat. Grösse, 21a. Kelch in vierfacher Vergrösserung.
- Fig. 22. Calophyllum serratum Maur.
 - 22. Längsschnitt, 22a. Querschnitt in nat. Grösse.
- Fig. 23. Zaphrentis domestica Maur.
 - 23. Längsschnitt, 23a. Querschnitt in nat. Grösse.
- Fig. 24. Ptychophyllum palmatum Maur.
 - 24. Aenssere Gestalt. 24a. ein in der Längsrichtung aufgeschlagener Stock.






Tafel II.

Fig. 1.	Cyathophyllum robustum Manr. 1. Stock mit erhaltener Epithek.
*24	1a. Längsschnitt, 1b. Querschnitt in 1½ facher Vergrösserung.
Fig. 2.	Campophyllum flexuosum Goldf. 2. Längsschnitt, 2a. Querschnitt.
Fig. 3.	Actinocystis inflata Manr. 3. Längsschnitt, 3a. Querschnitt.
Fig. 4.	Campophyllum vituberans Maur. 4. Längsschnitt, 4a. Querschnitt.

- Fig. 5. Pachypora cervicornis Blainv.
- Fig. 6. Cystiphyllum vesiculosum Goldf.

 Längsschnitt eines Exemplares mit grossen Blasen.
- Fig. 7, 8. Cystiphyllum vesicosum Manr.
 7. Exemplar mit theilweise erhaltener Epidermis.
 8. Längsschnitt.
- Fig. 9. Fascicularia caespitosa Goldf.
 9. Längsschnitt, 9a. Querschnitt in doppelter Vergrösserung.
- Fig. 10. Campophyllum turbatum Maur.

 10. Längsschnitt, 10a. Querschnitt in doppelter Vergrösserung.
- Fig. 11. Calceola sandalina Lam.
 - 11. Steinkern des Kelches mit dem Abdruck des Hauptseptum, 11a. die entgegengesetzte Seite mit dem Gegenseptum.
- Fig. 12, 13. Stromatopora concentrica Goldf.
 - 12. Querschnitt durch die Mitte eines Stockes.
 - 12 a. Querschmitt durch dessen Spitze.
 - $12\,\mathrm{b}.$ Längsschnitt desselben, mit umwachsener Koralle.
 - 13. Querschnitt durch einen asträoidisch gebildeten Stock.



			*	
•				
		28.7		
	·			
		4.		



Tafel III.

- Fig. 1-3. Stromatopora indubia Manr.
 - 1. Querschnitt, 2. Längsschnitt mit eingewachsener Syringop, expansa, in sechsfacher Vergrösserung.
 - 3. Längsschnitt eines anderen Exemplares in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 4. Stromatopora turgidecolumnata Maur. Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 5. Stromatopora Beuthii Bargatzky.


 Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 6, 7. Stromatopora maculosa Maur.
 - 6. Querschnitt in nat. Grösse.
 - 7. Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 8. Stromatopora curiosa Goldf.

Angewitterter Stock auf Alveolites Battersbyi aufgewachsen, in nat. Grösse.

Fig. 9. Stromatopora monostiolata Barg.?

Bruchstück eines Stockes in nat. Grösse mit Querschnitt.

- Fig. 10. Stromatopora Hainensis Maur.
 - 10. Oberfläche eines Stockes in nat. Grösse.
 - 10a. Untere Fläche in dreifacher Vergrösserung.
 - 10b. Querschnitt in dreifacher Vergrösserung.
- Fig. 11. Caunopora placenta Phill.
 - 11. Querschnitt, 11a. Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.









Tafel IV.

- Fig. 1. Haplocrinus stellaris F. Röm.
 - 1. Exemplar in nat. Grösse, 1a. dasselbe vergrössert.
- Fig. 2. Serpula ramosa Maur.
- Fig. 3. Serpula obliquilineata Maur.
 - 3a. Querschnitt.
- Fig. 4. Fenestella prisca Goldf.
 - 4. Bruchstück in nat. Grösse. 4a. Oberfläche, nach einem Guttapercha-Abdruck in vierfacher Vergrösserung.
- Fig. 5. Polypora spinosa Maur.
 - 5. Bruchstück in nat. Grösse.
 - 5a. Bruchstück in vierfacher Vergrösserung.
- Fig. 6-10. Entopora alvearis Manr.
 - 6. Theilweise erhaltener Stock.
 - 7. Kern mit dem Abdruck der inneren Wandfläche.
 - 8. Vergrösserter Querschnitt eines Steinkernes.
 - 9. Vergrösserter Querschnitt des Stockes, nach einem Guttapercha-Abdruck.
 - 10. Vorderseite des Stockes, nach einem Modell in neunfacher Vergrösserung.
 - 10a. Hinterseite desselben.
- Fig. 11. Alveolites ramosus Goldf.
 - 11. Längsschnitt in nat. Grösse.
 - 11a. Längsschnitt, 11b. Querschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 12, 13. Alveolites suborbicularis Lam.
 - 12. Obere, 12a. untere Fläche eines Stockes in nat. Grösse.
 - 13. Längsschnitt in nat. Grösse.
 - 13a. Längsschnitt, 13b. Querschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
- Fig. 14, 15. Alveolites Battersbyi Mil. Edw.
 - 14. Stock in nat. Grösse.
 - 15. Längsschnitt in nat. Grösse.
 - 15a. Längsschnitt, 15b. Maerschnitt in sechsfacher Vergrösserung.







Tafel V.

Fig. 1. Productus subaculeatus Murch.

 Dorsalschale. 1a. Muskeleindrücke der Dorsalschale, 1b. Muskeleindrücke der Ventralschale.

Fig. 2 Chonetes embryo Barr.?

2. Ventralschale in nat. Grösse, 2a. in doppelter Vergrösserung.

Fig. 3, 4. Orthis striatula Schloth.

4. Kern mit den Muskeleindrücken der Dorsalschale.

Fig. 5. Orthis canalieula Schnur.

5a. Kern mit Muskeleindrücken der Dorsalschale.

5b. Kern mit Muskeleindrücken der Ventralschale.

Fig. 6, 7. Orthis eanalicula var. aeuta Maur.

6. Ventralseite in nat. Grösse. 7a—d. Exemplar in doppelter Vergrösserung.

Fig. 8. Orthis areuata Phill.

Fig. 9. Orthis elegantula Dalm.?

9. Steinkern der Dorsalschale, 9a. der Ventralschale.

Fig. 10. Streptorhynehus? lepidus Schuur.

Fig. 11. Davidsonia Verneuili Bouch.

11a. Area.

Fig. 12, 13. Skenidium areola Quenst.

Fig. 14-16. Orthisina? Hainensis Maur.

14. Vollständiges Exemplar. 15. Exemplar mit theilweise erhaltener Schale.

16. Guttapercha-Abdruck des Steinkernes der Ventralschale, 16a. der Dorsalschale in 1½ facher Vergrösserung.

Fig. 17. Strophomena interstrialis Phill.

17a. Schalenstück vergrössert.

Fig. 18—20. Strophomena irregularis F. Röm.

18. Muskeleindrücke der Dorsalschale. 19. Kern mit Muskeleindrücken der Ventralschale.

20. Exemplar mit dornförmiger Verlängerung der Schlossecken.


Fig. 21. Strophomena lepis Bronn.

21. Muskeleindrücke der Ventralschale.


21 a. der Dorsalschale.

Fig. 22—25. Strophomena rhomboidalis Walıl.

Fig. 26. Strophomena anaglypha Kays. (Isolirte Ventralschale.)







Tafel VI.

Fig. 1.	Strophomena porrigata Maur.
	1. Theilweise erhaltene Schale nach einem Guttapercha-Abdruck
	1 a. Muskeleindrücke der Ventralschale.
	1 b. Stirnseite.

Fig. 2. Strophomena rugosa Maur. 2a. Ventralschale in zweifacher Vergrösserung.

Fig. 3. Strophomena conf. pecten Linné sp. Fig. 4, 5. Leptaena transversalis Wahl. sp.?

4. Muskeleindrücke der Ventralschale, 4a. der Dorsalschale. 5. ein erhaltener Schalentheil.

Fig. 6, 7 Spirifer concentricus Schnur.

Fig. 8-11. Spirifer curvatus Schloth.

Fig. 12—14. Spirifer Urii Flemm.

Fig. 15, 16. Spirifer simplex Phill.


Fig. 17. Spirifer indifferens, var. obesa Barr.?

Fig. 18. Spirifer indifferens Barr. var. elongata Maur.


Fig. 19, 20. Spirifer gibbosus Barr.

Fig. 21, 22. Spirifer gibbosus var. extensa Manr.

22. Vergrössertes Schalenstück.







Tafel VII.

3. Exemplar mit zahlreichen Falten in nat. Grösse.

4. Exemplar mit wenigen undeutlichen Falten in nat. Grösse.

Spirifer canaliferus Val.

Cyrtina heteroclita Defr.

Spiriferina? maerohyncha Schnur?

31. A. explanata Schloth.32. A. latilinquis Schnur.33. A. desquamata Sow.

35, 36. A. aspera Schloth.

37, A. sagittata Maur.

34. A. plana Kays.


Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3, 4.

Cyrtina Demarlii Bonch. Fig. 5, 6. Athyris Glassii Davids. Fig. 7. 7 c. Angeschliffenes Exemplar mit Spiralen, vergrössert. Merista passer Barr. Fig. 8—10. Fig. 11, 12. Merista prunulum Schnur. Merista Hecate Barr. Fig. 13, 14. Merista Hecate Barr. var. planolata Maur. Fig. 15. Meristella Circe Barr. Fig. 16, 17. Fig. 18, 19. Meristella upsilon Barr. 18. Ein wenig gedrücktes Exemplar. Fig. 20-22. Meristella Barrandii Maur. 22. Steinkern der Ventralschale, 22a. Steinkern der Dorsalschale ein wenig vergrössert. Whitfieldia tumida Dalm. Fig. 23. Fig. 24. Retzia ferita Buch. 24a., b. Vergrössertes Exemplar. Retzia longirostris Kays. Fig. 25. Retzia submelonica Maur, Fig. 26. Fig. 27. Bifida lepida Goldf. Fig. 28, 29. Uncites gryphus Schloth. Fig. 30—37. Atrypa reticularis Linné. 30, A. insquamosa Schnur.

35. Exemplar mit hoher Area, 36. Exemplare ohne sichtbare Area.





		·			

Tafel VIII.

Atrypa Eurydice Barr. Atrypa Philomela Barr.

Atrypa subcolumbella Maur.

Rhynchonella tetratoma Schnur.

Camarophoria? protracta Sow.

Rhynchonella triloba Sow.

Fig. 42-44. Camarophoria rhomboidea Phil.

Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3, 4.


Fig. 38.

Fig. 41.

Fig. 39, 40.

Fig. 5. Atrypa assula Barr. Atrypa assula, var. laevigata Maur. Fig. 6. Fig. 7. Atrypa canaliculata Barr. Atrypa verrucula Maur. Fig. 8. Fig. 9, 10. Glassia obovata Sow. 10. Kern mit den Muskeleindrücken der Ventralschale, 10a. der Dorsalschale. Fig. 11—15. Glassia Beyrichi Kays. 14. Kern mit den Muskeleindrücken der Dorsalschale, 14a. der Ventral-15. angewittertes Exemplar mit Spiralen. Fig. 16—22. Rhynchonella parrallelepipeda Bronn. 16. Rh. angulosa Schnur. 17. Rh. subcordiformis Schnur. 18. Rh. implexa Sow. 19. Rh. pentagona Goldf. 20. Rh. primipilaris Buch. 21, 22. Rh. angularis Phill. (22. vergrössertes Exemplar.) Fig. 23-25. Rhynchonella cuboides Sow. 23. Typisches Exemplar des Mitteldevon, etwas gedrückt. 24. Rh. impleta Sow. 25. Rh. erenulata Sow. Fig. 26, 27. Rhynchonella? subcuboides Gieb. Rhynch.? subcuboides, var. plana Maur. Fig. 28. Fig. 29-32. Rhynchonella pugnus Mart. 29. Rh. pugnoides Schnur. 30, 31. Rh. anisodonta Phill. 32. var. denticulata Maur. Fig. 33-36. Rhynchonella acuminata Mart. 34. var. plicata Sow. 35. var. platiloba Sow. 36. var. ephippia Maur. Fig. 37. Rhynchonella aptycta Schnur.

Drei verschiedene, nicht vollständig erhaltene Exemplare.



	63/-		
ş			
			16.1

	•					
,						
			•			
					٠	
				•		
		•				

Tafel IX.

Pentamerus galeatus Dalm.
Pentamerus biplicatus Schnur.
Pentamerus acutolobatus Sandb.
5. Ein gedrücktes Exemplar.
6. Jugendliches Exemplar?
Pentamerus sublinguifer Maur.
Pentamerus sublinguifer, var. glabra Maur.
Waldheimia Juvenis Sow.
Stringocephalus Burtini Defr.
Waldheimia Whidbornei Dav.
Avicula Wurmii A. Röm.
(Ein wenig vergrössert abgebildet.)
Conocardium aliforme Sow.
Conocardium Villmarense d'Arch. et de V.
Conocardium Villmarense, var. earinata Maur.
Conocardium Hainense Maur.

22, 23. Exemplare aus dem Kalk der Grube Hainau.

24. Exemplar aus dem Stringocephalenkalk von Söttenich in der Eifel.

25, 26. Exemplare aus der Cultrijugatusstufe von Niederlahnstein. (25. Schale nach einem Guttapercha-Abdruck, 26. Steinkern mit den Muskeleindrücken.)

Fig. 27—29. Cypricardinia elongata d'Arch. et de V.

29. Vergrösserter Schalentheil nach einem Guttapercha-Abdruck.

Fig. 30—33. Cypricardinia squamifera A. Röm.


Fig. 34. Cypricardinia erenicostata A. Röm.

34. Exemplar in natürl. Grösse, 34a. vergrössert.

Fig. 35, 36. Allorisma cancellata Manr.

Fig. 22-26. Conocardium retusum Maur.

36. Vergrössertes Schalenstück.





	,	

Tafel X.

Fig. 1a.	Dentalium robustum Maur.
Fig. 2, 3.	Pleurotomaria Orbigniana d'Arch. et de V.
Fig. 4a.	Euomphalus laevis d'Arch. et de V.
	4a. In doppelter Vergrösserung.
Fig. 5.	Loxonema tornatum Maur. (nat. Grösse).

Fig. 6. Littorina subrugosa Sandb.

Fig. 7, 8. Capulus priscus Goldf. Fig. 9, 10. Capulus immersus Barr.

Fig. 11, 12. Capulus conf. emarginatus Barr.

Fig. 13. Capulus conf. hamulus Barr.?

Fig. 14. Capulus dormitans Maur.

Fig. 15. Capulus Aries Maur.

Fig. 16—20. Capulus Hainensis Maur.

16—19. Steinkerne. 20. Exemplar mit theilweise erhaltener Schale.

Fig. 21—22. Capulus tuberosus Maur.


Fig. 23, 24. Capulus Selcanus Giebel?

Fig. 25. Capulus rigidus Maur.

Fig. 26-28. Capulus quadratus Maur.

Fig. 29-31. Tentaculites mucronatus Maur.

29. Abdruck des Gehäuses mit dem glatten Steinkern. 30. Schale in nat. Grösse, nach einem Guttapercha-Abdruck, 31. in doppelter Vergrösserung.





		- 40	
	15, 2		
	4		
· 9.			
*			

Tafel XI.

Fig. 1a, b. Primitia pila Maur.

1. Linke Klappe, 1a. Ventralseite, 1b. Charnierseite.

Fig. 2a. Primitia eontusa Maur.

2, Linke Klappe, 2a. Charnierseite.

Fig. 3a. Primitia leviter Maur.

3. Linke Klappe, 3a. Charnierseite.

Fig. 4, 5. Primitia fabula Maur.

4. Exemplar in nat. Grösse. 5. vergrösserte rechte Klappe, 5a. linke Klappe, 5b. Charnierseite.

Fig 6a-e. Orozoe marginata Maur.

6. Linke Klappe, 6a. rechte Klappe, 6b. Charnierseite der linken Klappe. 6c. entgegengesetzte Seite der rechten Klappe, 6d. u. e. Querprofile der beiden Klappen.

Fig. 7. Harpes macroecphalus Gold f.

Fig. 8-10. Proctus subplanatus Maur.

Fig. 11. Proetus informis Maur. in 3 facher Vergrösserung.

Fig. 12. Proctus consonus Maur.

Fig. 13—15. Proctus laevigatus Goldf.

Fig. 16, 17. Proetus gracilis Maur.

 Kopf in nat, Grösse, 16a, b. in 2¹/₂ facher Vergrösserung. 17. Pygidium in nat. Grösse.

Fig. 18, 19. Proctus quadratus Maur.

18a, b. In doppelter Vergrösserung.

Fig. 20—22. Cyphaspis hydrocephala A. Röm.

22. Pygidium (Steinkern), 22a. dasselbe vergrössert.

Fig. 23-26. Cyphaspis Strengi Maur.

25. Vorderer Theil der Glabella mit den Dornen, von der Scite. 26. restaurirtes Exemplar in doppelter Grösse.

Fig. 27—30. Phacops latifrons Bronn.

27, 28. Köpfe, 29, 30. Pygidien.

Fig. 31. Cheirurus gibbus Beyr.?

Fig. 32—34. Bronteus conf. umbellifer Beyr.


32. Bruchstück eines Kopfes, 33. Bruchstücke eines anderen Kopfes. 34. Pygidium.

Fig. 35, 36. Bronteus foedus Maur.

35. Ziemlich gut erhaltener Kopf, 35a. derselbe von vorne. 36. Bruchstück eines anderen Kopfes (auf der Abbildung ein wenig nach rechts geneigt).

Fig. 37, 38. Bronteus geminatus Maur.

37. Ein kleines Exemplar, 38. ein grösseres.





	,					
					•	
		•				
	•					
			•			
•						
						•
		,				
				4		
		-				
	·					
						•
						•
•						
1						
			•			
	•					

	•	

		3.6

4 ::		

